


11 වසර කාෂි ආහාර තාක්ෂණය

(4) කාෂි බෝගවල පසු අස්වනු හානිය

අස්වනු නෙලීමේ සිට පාරිභෝගිකයා අතට පත්වන තෙක් අස්වැන්නට සිදු වන ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක හානි පසු අස්වනු හානි ලෙස හැඳින්වේ.

ලංකාවේ මෙය 20% - 40% - ඉහළ අගයක් ගනී.



පසු අස්වනු සාධක ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි

- 1) අභ්‍යන්තර සාධක - බෝගයේ ශ්වසනය, උත්ස්වේදනය, කායික ක්‍රියාවලි මගින් සිදුවන හානි
- 2) බාහිර සාධක - අයහපත් දේශගුණික සාධක, පළිබෝධ හානි අයහපත් පරිහරණ විධි

පසු අස්වනු හානි සිදුවන අවස්ථා

- නෙලීමේදී - නියමිත පරිනත අවස්ථාවේදී නෙලා නොගැනීම
නෙලීමට සුදුසු උපකරණ භාවිතා නොකිරීම
අයහපත් දේශගුණික තත්ව ඇති විට අස්වනු නෙලීම
- පිරිසිදු කිරීමේදී - පිරිසිදු කිරීමේදී පිරිසිදු ජලය භාවිතා නොකිරීම
අල බෝග පමණට වඩා පිරිසිදු කිරීම
- ප්‍රවාහනයේදී - එළවළු පලතුරු පමණ ඉක්මවාපැටවීම
දුෂ්කර මාධ්‍යවත්වල අධික වේලාවක් ප්‍රවාහනය
අස්වනු මත මිනිසුන් නිදාගෙන යෑම
- ගබඩා කිරීමේදී - අස්වනු වර්ග කීපයක් එකම ස්ථානයක ගබඩා කිරීම
නුසුදුසු ගබඩා තත්ව යටතේ ගබඩා කිරීම
වාතනය දුර්වල වන පරිදි වක් ඇසුරුමක් තුළ විශාල අස්වනු
ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීම
- අලෙවියේදී - අධික හිරු එළිය, දූවිලි වලට නිරාවරණය වන පරිදි අලෙවි කිරීම
නරක් වූ එළවළු පළතුරු සමග හොඳ අස්වනු මිශ්‍ර කර අලෙවි කිරීම

පැවරුම :- ඉහත දක්වා ඇති පෙර අස්වනු හානි හා පසු අස්වනු හානි වළක්වාගත හැකි
ක්‍රම 10 බැගින් වෙන වෙනම ලැයිස්තු ගත කරන්න